


INSTRUKCJA OBSŁUGI

GAZY PIEPRZOWE



Ręczny miotacz gazu pieprzowego to narzędzie przeznaczone do samoobrony w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia przed ludzkimi i zwierzęcymi agresorami. Formuła oparta o kapsaicynoidy drażni śluzówkę napastnika, wywołując szereg nieprzyjemnych reakcji, ograniczając możliwości kontynuowania ataku.

W zależności od stężenia OC (Oleoresin Capsicum) gaz charakteryzuje się różnym czasem skutecznego działania – im wyższa wartość tym dłuższe działanie preparatu.

W zależności od stężenia MC (Major Capsainoids) gaz charakteryzuje się różną intensywnością działania. Preparaty o stężeniu MC do 0,5% poleca się do odstraszenia psów, 0,5-1,5% ludzi, natomiast powyżej 1,5% – niedźwiedzi. Preparat nie wywołuje trwałych efektów, a jego działanie może trwać do kilkudziesięciu minut.

Ręczne miotacze gazu pieprzowego mogą zawierać preparat w jednej z trzech form:



Ponadto sam miotacz może zostać wyposażony w dwa rodzaje dysz:



Miotacz może występować w dwóch formach, co z reguły zależy od jego pojemności:



W celu użycia urządzenia należy skierować dyszę w kierunku agresora, a następnie nacisnąć spust ukryty pod automatyczną zapadkę. Pełni ona funkcję bezpiecznika i wystarczy wsunąć pod nią palec, aby uzyskać dostęp do spustu. W przypadku niektórych modeli o konstrukcji gaśnicy może być konieczne wcześniejsze usunięcie blokującej zawlecarki.

Zabrania się stosowania miotacza wobec ludzi i zwierząt w sytuacji innej niż samoobrona. Podczas pracy z narzędziem należy zachować szczególną ostrożność. Należy upewnić się, że dysza skierowana jest w kierunku agresora oraz ocenić czy działanie wiatru nie powoduje porażenia gazem użytkownika. Należy również unikać – zwłaszcza w przypadku gazu z dyszą stożkową – stosowania go w zamkniętych pomieszczeniach, z uwagi na ryzyko porażenia osób postronnych oraz siebie. Aby zapewnić sobie największą skuteczność i bezpieczeństwo użycia, zaleca się wykonanie treningu użycia w warunkach kontrolowanych.

W przypadku incydentalnego porażenia należy oczyścić skórę chusteczką neutralizującą, lub w wypadku jej braku wodą z mydłem, a następnie użyć tłustego mleka lub tłuszczu roślinnego w temperaturze pokojowej w celu złagodzenia podrażnienia. W przypadku porażenia oczu należy stosować wyłącznie płukanie czystą, bieżącą wodą.